



Doação de sangue

Impedimentos



IHEBE

Instituto de **Hematologia**
e **Hemoterapia** de Belém



Estão relacionadas abaixo as principais causas de inaptidão à doação de sangue. Entretanto, esta relação não esgota o assunto. Algumas situações não estão incluídas nesta lista e serão definidas no ato da triagem clínica pela enfermeira ou pelo médico que realizará o seu questionário.

*O uso de alguns medicamentos impede a doação temporária ou definitivamente. Informe-se pela nossa Central sobre medicamentos, exames, cirurgias e tratamentos médicos que tenha realizado ou esteja em andamento, e que não estejam na relação abaixo.

Você estará impedido de doar sangue:

POR
48H

- ✓ Se recebeu vacina preparada com vírus ou bactéria mortos, toxóide ou recombinantes.
Ex.: cólera, poliomielite (salk), difteria, tétano, febre tifóide (injetável), meningite, coqueluche, pneumococo.
- ✓ Se recebeu vacina contra gripe.

POR
7
DIAS

- ✓ Se teve diarreia;
- ✓ Após terminarem os sintomas de gripe ou resfriado;
- ✓ Após a cura de conjuntivite;
- ✓ Extração dentária (verificar uso de medicação);
- ✓ Tratamento de canal (verificar medicação).

POR
2
SEMANAS

- ✓ Após o término do tratamento de infecções bacterianas (uso de antibióticos);
- ✓ Após a cura de rubéola;
- ✓ Após a cura de erisipela.

POR
3
SEMANAS

- ✓ Após a cura de caxumba;
- ✓ Após a cura de varicela (catapora).

POR
4
SEMANAS

- ✓ Se recebeu vacina de vírus ou bactérias vivos e atenuados.
Ex.: poliomielite oral (sabin), caxumba, febre amarela, sarampo, BCG, rubéola, catapora, varíola etc.
- ✓ Se recebeu soro antitetânico;
- ✓ Após a cura de dengue;
- ✓ Se cirurgia odontológica com anestesia geral;
- ✓ Após o retorno de região com surto de febre amarela.

POR
2
MESES

SOMENTE PARA HOMENS


- ✓ Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 3 meses se houve doação dupla de hemácias por aférese.

POR
3
MESES

SOMENTE PARA MULHERES

- ✓ Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 6 meses se houve doação dupla de hemácias por aférese.
- ✓ Após parto normal ou abortamento.





POR
3
MESES

INDEPENDENTE SE HOMEM OU MULHER

- ✓ Se foi submetido a apendicectomia;
- ✓ Se foi submetido a hemorroidectomia;
- ✓ Se foi submetido a hernioplastia;
- ✓ Se foi submetido a ressecção de varizes;
- ✓ Pessoas com bronquite e asma - , com crises a cada 3 meses ou menos, sem controle com medicamentos por via inalatória.

POR
6 MESES
A **1** ANO

- ✓ Se foi submetido a uma cirurgia de médio ou grande porte como por exemplo: colecistectomia, histerectomia, tireoidectomia, colectomia, esplenectomia pós-trauma, nefrectomia, etc.
- ✓ Após a cura de toxoplasmose comprovada laboratorialmente;
- ✓ Após qualquer procedimento endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, etc): aguardar 6 meses;
- ✓ Se fez piercing (se piercing na cavidade oral ou genital, devido ao risco permanente de infecção, isso implica em inaptidão por 12 meses após a retirada);
- ✓ Se contraiu febre amarela, aguardar 6 meses após recuperação completa (clínica e laboratorial).

POR
12
MESES

- ✓ Se recebeu uma transfusão de sangue, plasma, plaquetas ou hemoderivados;
- ✓ Se recebeu enxerto de pele;
- ✓ Se sofreu acidente se contaminando com sangue de outra pessoa;
- ✓ Se teve acidente com agulha já utilizada por outra pessoa;
- ✓ Se teve contato sexual com alguma pessoa com aids ou com teste positivo para HIV;
- ✓ Se fez sífilis ou gonorréia;
- ✓ Se fez contato sexual em troca de dinheiro ou de drogas ou com seus respectivos parceiros sexuais;
- ✓ Se teve contato sexual com usuário de droga endovenosa;
- ✓ Se teve contato sexual com pessoa que tenha recebido transfusão de sangue nos últimos 12 meses;
- ✓ Se teve relação sexual com pessoa com hepatite;
- ✓ Se fez tatuagem ou maquiagem definitiva;
- ✓ Se foi detido por mais de 72 horas.

POR
5
ANOS

- ✓ Após a cura de tuberculose pulmonar.



  @ihebeoficial

www.**ihebe**.com.br
91 3246-8292 | 99801-0809

